あきた夏丸

(秋田県農業試験場育成 農林水産省品種登録 第15132号)

200粒詰

(特長)

- 1 生育：茎葉の生育が旺盛で草勢は強い。葉が大きく節間はやや詰まる。花粉の出がよく着果は安定している。
- 2 熟期：糖度の上昇や果肉の発色は早い。旨味が完成するのは、露地普通栽培で開花後42～45日（積算気温で950℃）以上で「縞無双H」よりやや遅い。二次肥大で空洞が生じにくく、収穫期の幅が長く在圃性は高い。果面の縞模様に沿って生じるへこみが完熟果収穫の目安となる。
- 3 果実外観：果重は7～8kgと比較的大玉で、果形は正円形～腰高である。外皮は濃緑色、縞は太く鮮明である。
- 4 果肉：果肉の発色は鮮明な濃朱赤色、皮部との境目がはっきりとしており、カット販売に適している。糖度は11～13度と高く、果肉質は「縞無双H」と同様にめで歯ごたえがある。シャリ味が強いので食感が良い。
- 5 日持ち性：硬めの肉質であることから、日持ちが良い。（シャリ感が3週間程度持続）

(栽培のポイント)

- 1 整枝栽培、トンネル移動式栽培、露地普通栽培のいずれにも適する。ただ、普通栽培では品質の揃った果実を生産するために、つる数、着果数を制限する仕立て方法が望ましい。
- 2 草勢が強めであるため、台木は「ドンK」等の草勢の弱い品種を用いる。
- 3 草勢を抑えるために、基肥施肥量は慣行品種「必勝」の3～5割減位が適当である。着果後は、つるの伸びが止まるので追肥は慣行と同等とする。
- 4 ビニールトンネルを使用する場合、換気を十分おこない、厚く切れ込みの多い葉を作るよう心がける。
- 5 着果節位は18～20節以上の3番花を基本とする。
- 6 収穫適期の幅が広いので、早どりを避け、十分な熟度を確保してから収穫する。

畑10aあたりチツソ成分

	基肥	追肥
整枝栽培	1.0～3.0kg	
移動式栽培	1.5～2.5kg	3.0～4.0kg
普通栽培	3.0～4.0kg	3.0～4.0kg

(栽培暦)

作型	2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月		
	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中
整枝栽培	○					◎						交									■
トンネル移動式		○				◎						交									■
普通栽培				○					◎						交						■
							○					◎			交						■

○は種 ◎定植 交交配 ■収穫

生産販売元：公益社団法人秋田県農業公社 農業振興部 種苗センター TEL 0185-45-2322
 品種・栽培に関するお問い合わせ先：秋田県農業試験場 TEL 018-881-3330