


食味が良い黄皮の小玉スイカ

秋田農試交配

あきた夏丸チツチェゴールド

100粒詰



(育成経過)

「あきた夏丸チツチェ」の親系統に黄皮素材を導入して育成したF1品種です。

(特長)

- 果皮色が黄色である以外は「あきた夏丸チツチェ」と良く似ており、大玉に近い肉質でシャリ感が強く日持ち性が抜群です（室温で2週間程度）。「あきた夏丸チツチェ」よりやや大きく、果皮がやや厚く、**果肉が軟らかい**です。
- 熟期は、ハウス早熟栽培で開花後38日程度、露地普通栽培では32日程度です。
- 草勢が強く、大葉で、つるが太く節間は短めです。着果は安定しています。

品種名	果重 (kg)	縦横比	裂果	縞太さ	果皮色	果皮厚さ (mm)	果肉色	糖度(Brix)		果肉硬さ	空洞	シャリ感
								中心 (%)	皮際 (%)			
あきた夏丸チツチェ ゴールド	3.6	1.10	無	太	黄	8.7	やや淡赤	12.9	10.9	やや軟	少	強い
あきた夏丸チツチェ	3.0	1.10	無	太	緑	6.7	赤	13.5	11.7	中	無	強い

(栽培のポイント)

- 必ずユウガオ（かんぴょう）に接ぎ木して栽培します。
- 施肥量は「あきた夏丸チツチェ」と同様にします。
- 整枝栽培では株間80cm6本仕立て4果どり、移動式栽培では株間90cm6本仕立て6果どりを基本とします。

栽培暦

作型	月	2月		3月			4月			5月			6月			7月			8月	
	旬	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中
ハウス早熟			○		△			◎				交								
トンネル整枝 トンネル移動式				○		△		◎				交								
					○		△		◎				交							
						○		△		◎				交						
育苗後ハウス								○		△		◎						交		

○:は種 △:接ぎ木 ◎:定植 交:交配 □:収穫

生産販売元:(社)秋田県農業公社 農業振興部 種苗センター TEL 0185-45-2322

品種・栽培に関するお問い合わせ先:秋田県農業試験場 TEL 018-881-3330