


食味が良い黒皮の小玉スイカ

秋田農試交配

あきた夏丸チツチェブラック

100粒詰



(育成経過)

「あきた夏丸チツチェ」の親系統に黒皮素材を導入して育成したF1品種です。

(特長)

- 果皮色が黒緑である以外は「あきた夏丸チツチェ」と良く似ており、大玉に近い肉質でシャリ感が強く日持ち性が抜群です（室温で2週間程度）。「あきた夏丸チツチェ」よりやや大きく、果皮がやや厚く、**果肉が硬い**です。
- 熟期は、ハウス早熟栽培で開花後38日程度、露地普通栽培では32日程度です。
- 草勢が強く、大葉で、つるが太く節間は短めです。着果は安定しています。

品種名	果重 (kg)	縦横 比	裂果	縞 太さ	果皮 色	果皮 厚さ (mm)	果肉 色	糖度(Brix)		果肉 硬さ	空 洞	シャリ 感
								中心 (%)	皮際 (%)			
あきた夏丸チツチェ ブラック	3.3	1.10	無	太	黒緑	9.1	赤	13.2	11.1	硬	少	強い
あきた夏丸チツチェ	3.0	1.10	無	太	緑	6.7	赤	13.5	11.7	中	無	強い

(栽培のポイント)

- 必ずユウガオ（かんぴょう）に接ぎ木して栽培します。
- 施肥量は「あきた夏丸チツチェ」と同様にします。
- 整枝栽培では株間80cm6本仕立て4果どり、移動式栽培では株間90cm6本仕立て6果どりを基本とします。

栽培暦

作型	月	2月		3月			4月			5月			6月			7月			8月	
	旬	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中
ハウス早熟			○		△			◎			交				□					
トンネル整枝				○		△		◎			交				□					
トンネル移動式					○	△		◎			交				□					
						○	△		◎		交				□					
育苗後ハウス							○	△		◎		交			□					

○:は種 △:接ぎ木 ◎:定植 交:交配 □:収穫

生産販売元:(社)秋田県農業公社 農業振興部 種苗センター TEL 0185-45-2322

品種・栽培に関するお問い合わせ先:秋田県農業試験場 TEL 018-881-3330